

PLAN SANITAIRE D'ELEVAGE CAPRINS

NB : Les calendriers présentés ci-après présentent les périodes optimales d'application des traitements préventifs pouvant être réalisés dans les conditions classiques d'élevage dans le Cher. Le choix définitif de l'application d'un traitement et de sa période d'application ainsi que des mesures complémentaires, revient au vétérinaire prescripteur, dont la mission est d'adapter le schéma préventif à chaque élevage.

CHEVRETTES

<i>Période d'intervention</i>	<i>Problèmes sanitaires</i>	<i>Produits retenus</i>
A la naissance	Carences vitaminiques	• Vitamines.
4 à 6 semaines après la naissance (selon le statut vaccinal des mères)	Echtyma	• Vaccin contre l'Echtyma contagieux.
Avant l'hiver	Dicrocoeliose	• Albendazole.
• 1 mois après la mise à l'herbe • 1 mois après le 1er traitement • avant la saillie	Strongyloses digestives et respiratoires	• Anthelminthiques : albendazole, fébantel, fenbendazole, oxfendazole, éprinomectine.
A partir de J + 12 semaines	Fièvre Q risque d'excrétion bactérienne	• Primovaccination contre Coxiella Burnetii, pour les élevages engagés dans un programme d'assainissement
A partir de J + 15 semaines	Fièvre Q risque d'excrétion bactérienne	• Rappel de la primovaccination contre Coxiella Burnetii, pour les élevages engagés dans un programme d'assainissement

CAPRINS ADULTES

<i>Période d'intervention</i>	<i>Problèmes sanitaires</i>	<i>Produits retenus</i>
4 semaines avant la mise-bas	Carences vitaminiques du nouveau-né	• Vitamines.
6 à 2 semaines avant la mise-bas	Entérotoxémies et Tétanos Echtyma Toxi-infections et affections colibacillaires des chevreaux	• Vaccin contre les entérotoxémies à Clostridia et contre le tétanos (primovaccination ou rappel). • Vaccin contre l'Echtyma contagieux. • Vaccin contre les affections septicémiques des jeunes dues aux salmonelles par immunisation de la femelle gestante.
5 et 2 semaines avant la mise-bas	Mammites	• Vaccin contre les mammites à Staphylococcus aureus
Été, Automne, entrée de l'hiver	Parasitoses externe	• Antiparasitaires externes: amitraz, diazinon.
A la rentrée en chèvrerie et avant la mise-bas • Avant la mise bas • pendant la saison de pâture • avant la saillie	Dicrocoeliose Strongyloses digestives et respiratoires	• Albendazole. • Anthelminthiques : albendazole, fébantel, fenbendazole, oxfendazole, éprinomectine.
11 semaines avant la lutte	Fièvre Q risque d'excrétion bactérienne	• Primovaccination ou rappel de vaccination contre Coxiella Burnetii pour les élevages engagés dans un programme d'assainissement et nécessitant une <u>vaccination des adultes</u>
8 semaines avant la lutte	Fièvre Q risque d'excrétion bactérienne	• Rappel de primovaccination (si nécessaire) contre Coxiella Burnetii pour les élevages engagés dans un programme d'assainissement et nécessitant une <u>vaccination des adultes</u>
Avant la lutte	Maîtrise de l'oestrus	• Cloprosténol, flugestone, gonadotrophines sériques.